

Vacunación a menores escolarizados (16 y 17 años)

Vacuna Disponible: Pfizer

Contraindicaciones:

- Antecedentes de ALERGIAS GRAVES con falta de aire (anafilaxia, edema de glotis, etc.) que hayan requerido asistencia médica o internación
- Vacunación en personas que recibieron tratamiento con anticuerpos monoclonales contra SARS-CoV-2 o plasma de convaleciente deben posponer vacunación por 90 días
- Inmunocompromiso (sólo se vacunará con prescripción médica)
- Enfermedad febril aguda GRAVE (con compromiso del estado general, ejemplo neumonía)
- Enfermedad crónica con mal estado general (ejemplo: crisis de asma no controlada, pedir prescripción del médico tratante)
- Epilepsia no controlada o enfermedad neurológica progresiva (pedir prescripción del médico tratante)

No pueden recibir la 2º dosis, las personas que tuvieron reacción anafiláctica y/o 40°C luego de la primera dosis.

Vacuna PFIZER - Vacuna inactivada no replicativa

2 dosis de aplicación intramuscular, con un intervalo de 21 días entre la primera y segunda dosis.

EFFECTOS ADVERSOS MÁS FRECUENTES

- **LOCALES:** dolor, edema o hinchazón, enrojecimiento, prurito, rash o aumento de la temperatura en el lugar de la inoculación.
- **GENERALES:** fiebre transitoria, fatiga, cefalea, diarrea, tos, disnea, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, somnolencia, mareos, anorexia.

En caso de presentar algún síntoma que persista por más de 48 hs , presentarse a su médico de confianza o al centro de salud más cercano.